



BRÖSTCANCER  
FÖRBUNDET

# Forskningsrapport

## Huvudsökande:

Jana de Boniface  
Adjungerad professor  
Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm



## Frågeställning:

Kan man undvika att utrymma armhålan hos patienter med bröstcancer och mikroskopisk spridning till portvaktscörteln?

## Tre frågor till Jana:

### Hur kan resultatet av er forskning hjälpa patienterna, rent konkret?

SENOVIC-studien undersökte om vi kan låta bli att ta fler lymfkörtlar från armhålan även om den eller de första, vid portvaktscörtelbiopsin, uppvisar tumörspridning i form av mikrometastaser (tumöravlagringar upp till 2 mm i storlek).

På det sättet kan man minska risken för till exempel lymfödem eller rörelseinskränkningar i armen och axeln, men det kan bara göras under förutsättningen att man inte försämrar prognosen.

SENOVIC har visat att överlevnaden är utmärkt och återfallsrisken låg även om man inte utrymmer armhålan hos patienter där man ser små tumörhärdar i portvaktscörtelbiopsin.

Idag görs inte någon utrymning av armhålans lymfkörtlar hos dessa patienter längre.

### Hur viktigt har stödet från Bröstcancerförbundet varit för er forskning?

Stödet från Bröstcancerförbundet har möjliggjort för oss att ta tid från kliniken för att genomföra denna stora nationella studie. Utan tid ingen forskning!

### Vad vill du hälsa alla Bröstcancerförbundets givare?

Ni är otroligt viktiga då kliniska forskare behöver ekonomisk ersättning för sin lön för att kunna ta tid till forskning!

Ett stort tack från alla oss som har jobbat i SENOVIC!